

## Période de sensibilité des espèces d'intérêt communautaire du site Natura 2000 des Gorges de la Dordogne (FR7412001)

Espèces	Début de période de reproduction	Fin de période de reproduction	Distance estimée de tranquillité depuis le nid	Habitat préférentiel pour nidification
<b>Les rapaces d'intérêt européen</b>				
<b>Busard Saint-martin</b>	15 mars	15 août	150 mètres	Landes, friches forestières de 3 à 15 ans après la coupe.
<b>Milan noir</b>	15 mars	01 août	150 mètres	Lisières de futaies feuillues ou résineuses en bord de plan d'eau ou de cours d'eau.
<b>Milan royal</b>	15 février	15 juillet	150 mètres	Forêts de feuillus avec gros arbres, en Limousin souvent en forêt de pente mais aussi dans des bosquets isolés.
<b>Bondrée apivore</b>	1 <sup>er</sup> mai	1 <sup>er</sup> septembre	150 mètres	Futaie (feuillue ou mixte) ou accrus avec arbres de plus de 15 mètres de haut.
<b>Circaète Jean-le-Blanc</b>	15 mars	1 <sup>er</sup> septembre	250 mètres	Boisements clairs de pin sylvestre ou boisements mixtes avec pins sylvestres émergents d'une cinquantaine d'années, orientés vers l'est, au tiers supérieur des versants.
<b>Aigle botté</b>	1 <sup>er</sup> avril	15 août	250 mètres	Forêts de feuillus ou de résineux avec de gros et vieux arbres. En Limousin, généralement dans le tiers supérieur des forêts de feuillus de pente, orientation Nord préférée.
<b>Faucon pèlerin</b>	1 <sup>er</sup> février	20 juin	200 mètres	Milieus rupestres
<b>Grand-duc d'Europe</b>	1 <sup>er</sup> décembre	1 <sup>er</sup> août	200 mètres	Milieus rupestres
<b>Les Pics d'intérêt européen</b>				
<b>Pic noir</b>	15 mars	15 juillet	50 mètres	Vieille futaie de hêtre
<b>Pic cendré</b>	1 <sup>er</sup> mars	1 <sup>er</sup> juillet	50 mètres	Diverses futaies de feuillus avec vieux arbres, des forêts de pente aux ripisylves.
<b>Pic mar</b>	1 <sup>er</sup> mars	1 <sup>er</sup> juillet	50 mètres	Futaies de feuillus, mais aussi bocage ou ripisylves, avec vieux arbres, souvent chênaies.
<b>Les autres espèces d'intérêt européen</b>				
<b>Martin-pêcheur d'Europe</b>	15 mars	15 juillet	50 mètres	Habitats aquatiques
<b>Engoulevent d'Europe</b>	1 <sup>er</sup> mai	15 août	100 mètres	Landes, friches forestières jusqu'à 15 ans après la coupe.
<b>Cigogne noire</b>	1 <sup>er</sup> mars	1 <sup>er</sup> septembre	300 mètres	Forêts de grande superficie, généralement de feuillus, avec de gros arbres pour le nid.
<b>Alouette lulu</b>	1 <sup>er</sup> mars	1 <sup>er</sup> août	50 mètres	Landes, pelouses, friches forestières jusqu'à 15 ans après la coupe.
<b>Pie-grièche écorcheur</b>	1 <sup>er</sup> mai	15 août	50 mètres	Landes, pelouses, friches forestières jusqu'à 15 ans après la coupe, le tout avec présence de nombreux buissons.